

Variedades.

TRATAMIENTO DE LA TOS FERINA

Se cree generalmente que la tos ferina es una enfermedad que se puede dominar por un tratamiento bien definido. Esto es verdad si con ello se quiere decir que los principios generales de higiene, tales como el cambio de aire, el aislamiento, la desinfección, son aplicables con buen éxito; pero no lo es si se atiende a la acción de los medicamentos.

El tratamiento de la *coqueluche* debe variar con los períodos de la enfermedad, que son tres: período de incubación, caracterizado por signos catarrales y que dura de seis a ocho días; el de bronquitis con fiebre (tos tenaz, frecuente y fiebre), que dura de tres a quince días, y período de los quintos o accesos de tos, que coincide con la caída de la fiebre, y que dura dos o más meses.

En el período de incubación, o sea cuando en un niño con manifestaciones catarrales se sospecha que ha habido el contagio, se le abrigará y la habitación se hará ventilar ampliamente, y se practicarán alrededor del lecho pulverizaciones de agua boricada u oxigenada, y se hará la desinfección de las fosas nasales aplicando en las narices tres veces por día inyecciones de algunas gotas de aceite gomenolado.

Los gargarismos antisépticos serían útiles, pues es casi imposible que el niño los practique; pero sí se le puede lavar la boca con una mezcla de diez gotas del siguiente líquido, en un vaso de agua hervida:

Tintura de canela	} a.a 20 gramos
Tintura de eucaliptos	
Alcohol a 36°	80 gramos
Timol	3 gramos

M.

En el período de catarro brónquico, que es el segundo, sucede una de dos cosas: o por sospecharse que ha habido contagio, por tener razones para ello, se ha empleado la precedente medicación; o se ignora que haya habido contagio, y se ha procedido como con un simple contagio.

En el primer caso se dará seis veces por día una cucharadita dulcera del siguiente jarabe:

Piramidón.....	2 gramos.
Jarabe de belladona.....	20 gramos.
Oximiél exilítico.....	} a.a 40 gramos.
Jarabe de goma.....	

M.

En el segundo caso, en que puede no tratarse sino de un catarro ordinario, se darán tres cucharadas de lo siguiente:

Polvo de Dower.....	0 gramos 15.
Alcoholatura de acónito.....	V gotas.
Agua destilada de laurel cerezo..	3 gramos.
Jarabe de goma.....	150 gramos.

M.

Cuando llega el «período de los accesos» hay que tener mucha paciencia y procurar disponer de muchos medios de acción. Tan pronto como la fiebre cae, los quintos se vuelven más frecuentes, y entonces hay que emplear durante tres días el jarabe de piramidón y belladona, ya mencionado, y durante los tres siguientes cuatro a seis cucharaditas diarias de esta poción:

Bromoformo.....	48 gotas.
Aceite de almendras dulces. }	} a.a 15 gramos.
Goma arábica.....	
Agua destilada de laurel cerezo	4 gramos.

Agua destilada, cantidad suficiente para hacer 120 gramos; mézclase muy bien y agítese antes de usar.

Una cucharadita dulcera contiene dos gotas de bromoformo.

Pueden darse cuatro gotas de bromoformo por cada año de edad, principiando por cuatro años, pero no deben darse más de 30 gotas en veinticuatro horas.

Desde que los quintos de tos aparecen, debe instituirse la medicación contra ellos. En toda coqueluche hay que proceder a la vacunación o a la revacunación desde que el diagnóstico sea claro; por lo menos en la mitad de los casos se acorta así la enfermedad y los accesos pueden bajar de cuarenta a diez o cinco por día. La vacuna que se debe emplear es la *jeneriana* o antivariolosa.

A esta indicación que hace el *Bulletin Général de Thérapeutique* debemos agregar que el distinguido médico colombiano doctor Francisco A. Vélez indicó la vacunación antivariolosa en la tos ferina, en un trabajo que presentó al primer Congreso Médico de Colombia, reunido en Bogotá en julio de 1893.

Si la vacuna no tiene buen éxito, se podrán emplear inhalaciones de yoduro de etilo; cuando se produce un quinto de tos se rompe un ampolleta, que se hace respirar al niño; en la mitad de los casos el quinto aborta y se llega a disminuir considerablemente el número de ellos.

El cambio de aire no es conveniente sino en el período de incubación, y más tarde cuando los accesos comienzan a disminuir.

TRATAMIENTO DEL CÓLICO HEPÁTICO

El doctor Marini aconseja emplear el siguiente tratamiento en un caso de cólico hepático:

Indicación esencial—1º Dar un baño tibio a 35º, de una hora de duración.

2º Dar opio y belladona en supositorios, así:

Extracto de belladona	} a. a 2 centigramos
Extracto de opio.....	

Manteca de cacao. 2 gramos 50 centigramos.

Para un supositorio. Se aplica al salir del baño.

3º Tomar de 200 a 300 gramos de aceite de olivas en el curso de una hora, por cucharadas. Después de cada cucharada se tomará una tajada de naranja para disimular el gusto del aceite.

4º Glicerina y agua cloroformizada, así:

Glicerina.....	40 gramos.
Benzoato de soda.....	1 gramo 50 centigramos.
Agua cloroformizada salu- rada.....	50 gramos
Salicilato de soda	1 gramo 50 centigramos.
Jarabe de éter... .. .	30 gramos.

M.

Para tomar una cucharada cada dos horas. Deben principiarse tres horas después de la ingestión del aceite de olivas.

Si el enfermo no se alivia, en el intervalo de los baños puede aplicarse una gran cataplasma caliente y administrársele una gran lavativa fría cada hora o cada dos horas.

Por bebida ordinaria, agua helada.

Durante la crisis la alimentación consistirá en leche cuajada y caldo desengrasado. En el intervalo de las crisis se permiten las legumbres verdes y las frutas. Deben prohibirse los alimentos grasos y los huevos.

En los intervalos de las crisis se continuará el uso del aceite de olivas en la dosis de 100 gramos por día, que se tomará en ayunas, o bien, la poción glicerinada ya mencionada.

5º Una botella de agua de *Villacabras* cada tres días, o la poción siguiente:

Sulfato de soda.....	25 gramos.
Glicerina pura.....	40 —
Salicilato de soda.....	1 gramo.
Fosfato de soda	1 —
Benzoato de soda.....	1 —
Jarabe de corteza de naranja.....	40 gramos.
Cocimiento de genciana.....	50 —

M.

Para tomar por la mañana en ayunas en dos dosis, con dos horas de intervalo.

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Refiere *The Lancet* que el doctor Muthée ha empleado desde hace trece años inhalaciones antisépticas repetidas en el tratamiento de tuberculosis hospitalizados en un sanatorio, y ha obtenido los resultados más satisfactorios en la mayoría de los casos.

Emplea las siguientes soluciones:

Solución A:

Formalina.....	12	gramos	50	centigramos.
Cloroformo.....	4	—		
Mentol.....	0	—	60	—
Esencia de tremen-				
tina.....	0	—	90	—
Alcohol a 30°.....	4	—		

M.

Solución B:

Formalina.....	5	gramos.		
Guayacol.....	2	—	50	centigramos.
Cloroformo.....	4	—		
Mentol.....	0	—	90	—
Esencia de tremen-				
tina.....	0	—	90	—
Alcohol a 36°.....	10	—		

M.

Solución C:

Guayacol.....	8	gramos.		
Cloroformo.....	4	—		
Esencia de tremen-				
tina.....	0	—	90	—
Alcohol a 36°.....	10	—		

M.

Para estas inhalaciones el líquido se pone a evaporar al baño de maría, o se coloca en un aparato inhalador. Se principia por emplear la solución A y después

Colegio Mayor de
 FACULTAD DE
 MEDICINA

la solución B en el día; en la noche se empleará de preferencia la solución C.

Al principio de este tratamiento las inhalaciones se harán cada dos horas, en los enfermos que no estén aún graves y no tengan fiebre ni mucha tos. La duración de las inhalaciones irá aumentando progresivamente hasta nueve horas; después se disminuirá esa duración progresivamente hasta llegar a dos horas.

En los enfermos obligados a guardar cama y consumidos por la fiebre, las inhalaciones deben ser continuas en el día y en la noche. Una dispnea muy marcada y las hemoptisis son contraindicación para este tratamiento.

POCIÓN DIURÉTICA

Para estimular la actividad de los riñones el doctor Herbert aconseja el uso de esta preparación:

Acetato de potasa.....	4	gramos.
Tintura de escila.....	80	gotas.
Jarabe de eucalipto.....	60	gramos.
Infusión de uva ursi.....	250	—

M.

Para tomar esta poción por cucharadas en veinticuatro horas.

PRURITO

La siguiente pomada da buenos resultados:

Mentol.....	0	gramos	40	centigramos.
Salicilato de metilo..	2	—		
Oxido de cinc.....	12	—		
Lanolina..	8	—		
Vaselina.....	12	—		

M.

Se aplicará una o dos veces en el día en las partes afectadas.