

FORMULARIO

TRATAMIENTO DE LAS CONJUNTIVITIS— Como todas son contagiosas, debe procurarse guardar precauciones para no comunicarla a otras personas.

Conjunctivitis follicular.

Baños biconotidianos con la solución de hiposulfito de soda (20 gramos por 500 de agua pura); después instalar uno de estos colirios:

R.
Argirol 0.20 centigramos.
Agua destilada hervida. 10 gramos.

M.

R.
Alumbre 0.10 centigramos.
Agua destilada hervida... 10 a 15 gramos.

M.

Conjunctivitis de gonococos.

No debe usarse vendaje oclusivo. Poner compresas repetidas de agua fría hervida durante el período en que corre el pus. Tres veces por día lavado intraocular, haciendo pasar dos o trescientos gramos de solución de permanganato de potasa (1 por 3,000). Emplear separadores palpebrales, *evitando con gran cuidado el traumatismo de la córnea* y vigilar el estado de ésta. Una o dos veces por día instilar (sin cocaína y sin agua salada) dos gotas de nitrato de plata al 1 por 10⁴; esto se continuará hasta la desaparición de la secreción. Entonces se puede reemplazar por:

R.
Argirol 1 a 2 gramos.
Agua destilada 10 gramos.

Si hay ulceración de la córnea, el mismo tratamiento, pero no pasar de nitrato al 1 por 100, y poner atropina (al 1 por 200) una o dos veces por día.

Conjunctivitis catarral aguda.

El mismo tratamiento que la forma anterior con el nitrato al 1 por 100; y al mediodía instilación del colirio de argirol. El argirol puede reemplazarse así:

R.
Protargol 0.20 a 0.30 centigramos.
Agua destilada hervida.... 10 gramos.

M.

Conjuntivitis catarral subaguda.

Dos o tres veces al día limpiar los bordes palpebrales con algodón empapado en este colirio, y después instalar en el ojo unas gotas.

Sulfato de cinc. 0.10 a 0.20 centigramos.
 Agua destilada hervida. 10 gramos.

M.

Tres gotas dos o tres veces en el día.

Conjuntivitis granulosa. Tracoma.

Cuidar de separar de la escuela al niño. Instilar diariamente:

R.

Sulfato de cobre. 0.20 a 0.75 centigramos.
 Novocaína 0.15 centigramos.
 Glicerina 10 gramos.

M.

Más tarde se agregará un masaje semavai, previa cocaínización, en la mucosa del párpado superior invertido, con el polvo siguiente:

Sulfato de cobre pulverizado. 1 gramo.
 Acido bórico 50 gramos.

Este masaje se prolongará hasta que haya un poco de sangre; en seguida se lava con agua hervida antes de colocar el párpado en su sitio.

Conjuntivitis ligeras.

Tanto para tratar éstas como para prevenir la conjuntivitis catarral y el tracoma, se emplean dos gotas diarias de este colirio en cada ojo:

R.

Sulfato de cinc 1 gramo.
 Solución de adrenalina al 1 por 1,000. 10 gramos.
 Agua destilada 100 gramos.

M.

Este tratamiento preventivo debe emplearse donde reinen conjuntivitis catarrales o granulosas, en las escuelas, en los campos agrícolas, en las familias, etc. Esta aplicación es muy fácil, puede hacerla cualquier persona inteligente, y evita muchas graves complicaciones.