ESTADISTICA

de los casos operados en la Clínica particular del doctor MANUEL A. CUÉLLAR DURÁN (de Bogotá), en el año comprendido entre el 1º de mayo de 1918 y el 30 de abril de 1919. (Año III). Bogotá, mayo de 1919.

INTERVENCIONES EN EL GLOBO OCULAR Y SUS ANEXOS. INTERVENCIONES EN LAS VÍAS LAGRIMALES, LOS PÁRPADOS, LA CONJUNTIVA Y LA CÓRNEA

1. N. N., de diez ocho años, natural de Guatavita, procedente de Bogotá, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Parece que su enfermedad es de origen puramente nervioso.

Diagnóstico. Entopión nervioso del párpado inferior del O. D.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (mayo 16 de 1918). Con anestesia local se hizo la sutura de Gaillard.

Resultado. Curación.

2. N. N., de veinticuatro años, natural y procedente de Bogotá, soltero, militar.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Angioma conjuntival externo del O. I. y varicosidad general de los vasos conjuntivales.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (junio 26 de 1918). Con anestesia local se extirparon el tumor y los vasos varicosos.

Resultado. Curación.

3. N. N., de cuarenta y tres años, natural y procedente de Nilo, soltero, agricultor.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Pterigio interno del O. D.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (junio 26 de 1918). Con anestesia local se practicó la extirpación del pterigio.

Resultado. Curación.

4. N. N., de treinta y cinco años, natural de Jericó, procedente de Ubaté, religioso.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Pterigio interno de ambos ojos.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (julio 26 de 1918). Con anestesia local se extirparon ambos pterigios en una sola sesión.

Resultado. Curación.

5. N. N., de treinta y cinco años, natural y procedente de Bogotá, casado, zapatero.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Pingüécula doble.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (julio 26 de 1918). Con anestesia local se extirpó la del O. D.

Resultado. Curación del ojo operado.

6. N. N., de veintiocho años, natural y procedente de Tocaima, soltero, comerciante.

Datos importantes. Atribuía su enfermedad a un traumatismo producido por un latigazo.

Diagnóstico. Pterigio interno del O. D.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (agosto 30 de 1918). Con anestesia local se hizo la extirpación del ptergio.

Resultado. Curación.

7. N. N., de veintiocho años, natural y procedente de Sogamoso, casado, agricultor.

Datos importantos. Ninguno.

Diagnóstico. Pterigio interno doble; mayor el del O. D.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (septiembre 18 de 1918). Con anestesia local se extirparon ambos pterigios en una sola sesión.

Resultado. Curación.

8. N. N., de sesenta y seis años, natural y procedente de Zapatoca, casado, jornalero.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Pterigio interno doble; el del O. I. enorme.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento. Se practicaron dos intervenciones: la una (diciembre 14 de 1918) consistió en extirpación de los pterigios con anestesia local; la otra, véanse las observaciones de intervenciones sobre el iris.

Resultado. Curación.

9. N. N., de treinta años, natural y procedente de Bogotá, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Pterigio interno de ambos ojos.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (noviembre 24 de 1918). Con anestesia local se extirparon ambos pterigios en una sola sesión.

Resultado. Curación.

10. N. N., de seis años, natural y procedente de Bogotá (mujer).

Datos importantes. Tuvo un traumatismo de los huesos nasales.

Diagnóstico. Dacriocistitis supurada y fractura de los huesos nasales con aplanamiento de la raíz de la nariz.

Pronóstico. Bueno respecto a la dacriocistitis; la fractura de los huesos nasales dejará, sin duda, una deformación permanente.

Tratamiento (enero 30 de 1919). Con anestesia general por el cloroformo se hizo la extirpación del saco lagrimal.

Resultado. Curación de la dacriocistitis.

11. N. N., de veintiocho años, natural y procedente de Caldas (Tolima), casada, panadera.

Datos importantes. Tuvo una úlcera de la córnea del O. I. complicada de iridociclitis.

Diagnóstico. Manchas de la córnea del O. I. consecuenciales a úlceras de origen conjuntival.

Pronóstico. Malo para la visión; bueno para la estética.

Tratamiento. Con anestesia local se hizo el tatuado de la córnea manchada, en dos sesiones (enero 31 y febrero 15 de 1919).

Resultado. El ojo tatuado quedó idéntico al sano.

12. N. N., de sesenta y dos años, natural de Sogamoso, procedente de Bogotá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Tiene una obstrucción doble de los canales lagrimales, pero solamente el del lado izquierdo ha supurado.

Diagnóstico. Dacriocistitis doble, supurada del lado izquierdo.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento. Con anestesia local se practicó la extirpación del saco del lado izquierdo en tres sesiones diferentes, porque siempre quedaban

residuos de saco donde se depositaban las lágrimas, y mantenían la supuración (febrero 5 y 18, marzo 3 de 1919).

Resultado. Curación.

13. N. N., de veintinueve años, natural y procedente de Bogotá, soltera, cajera.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Pterigio interno doble; mayor del O. I.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (febrero 10 de 1919). Con anestesia local se extirparon ambos pterigios en una sola sesión.

Resultado. Curación.

14. N. N., de treinta y cinco años, natural de Ubaque, procedente de La Mesa, casado, empleado público.

Antecedentes y datos importantes. La enfermedad hace cerca de quince años que le principió.

Diagnóstico. Enorme pterigio interno del O. I. que avanza sobre casi toda la córnea; incipiente del O. D.

Pronóstico. Reservado, a causa de la posible opacidad de la córnea, debajo del tejido de nueva formación.

Tratamiento (abril 23 de 1919). Se extirpó íntegro el pterigio con anestesia local; la córnea estaba transparente debajo de él en casi toda su extensión.

Resultado. Curación.

INTERVENCIONES EN EL IRIS, EL CRISTALINO Y LA CRISTALOIDE

15. N. N., de cincuenta y cinco años, natural y procedente de Bogotá, soltera, costurera.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble; más avanzada en el O. I.

Pronóstico. Sensación luminosa normal.

Tratamiento (mayo 6 de 1918). Con anestesia local se operó el O. I.; incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del cristalino; salió una pequeña cantidad de vítreo. Cicatrización al sexto día. Tuvo una iritis y una conjuntivitis que cedieron en pocos días al tratamiento adecuado.

Resultado.

O. D.=catarata.
O. I.=+ 11 $V=\frac{5}{9}$

16. N. N., de treinta y seis años, natural y procedente de Samacá, casado, jornalero.

Datos importantes. Su enfermedad actual la atribuye con mucha probabilidad a un traumatismo.

Diagnóstico. Luxación traumática del cristalino derecho hacia la parte inferior del globo y opacidad completa de la lente.

Pronóstico. Reservado a causa de lo peligroso de la operación.

Tratamiento (mayo 13 de 1918). Se operó el O. D. con anestesia local; incisión córneoconjuntival superior y extracción combinada del cristalino luxado por medio del asa de cuerpos extraños en tres tiempos porque se desgarraba al tocarlo; salió poco más o menos 1 centímetro cúbico de vítreo. Cicatrización al septimo día.

Resultado.

O. D.=+13º $V=\frac{5}{25}$
O. I.=O. D.

17. N. N., de treinta y siete años, natural y procedente de Chía, casado, agricultor.

Datos importantes. Tuvo una conjuntivitis del O. I. complicada de iridociclitis, después de la cual perdió la visión.

Diagnóstico. Catarata secundaria del O. I.

Pronóstico. Reservado a causa de la iridociclitis anterior.

Tratamiento (mayo 14 de 1918). Con anestesia local se operó el O. I. Incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al septimo día.

Resultado.

O. D.=O. D. $V=\frac{5}{7}$
O. I.=+8.

18. N N., de veintidós años, natural de Serrezuela, procedente de Bogotá, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Tiene una miopia de 22 D. en ambos ojos.

Diagnóstico. Miopia de 22 D., complicada de retinitis miópica.

Pronóstico. Reservado a causa del número de intervenciones que sin duda hay que practicarle.

Tratamiento. Se practicaron varias intervenciones: en primer lugar la discisión del cristalino transparente para volverlo opaco (mayo 20 de 1918), después de la cual tuvo una reacción del iris que cedió al tratamiento dejando una sinequia anterior; luégo en dos sesiones (julio 22 y agosto 13 de 1918), con anestesia local se practicó la extracción simple del cristalino opacifica-

do; en ambas salió una pequeña cantidad de vítreo, O. D.

Resultado.

O. D.=+7° V=$\frac{5}{14}$
O. I.=−22D.

19. N. N., de cincuenta y tres años, natural y procedente de Bogotá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble; más avanzada en el O. D.

Pronóstico. Sensación luminosa normal.

Tratamiento (mayo 22 de 1918). Con anestesia local se operó el O. D.; incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del núcleo central del cristalino; las masas se extrajeron con la cureta. Cicatrización al séptimo día. Tuvo como complicaciones postoperatorias una iritis y una conjuntivitis del ojo operado, que cedieron al tratamiento adecuado.

Resultado.

O. D.=+10° V=$\frac{5}{15}$
O. I.=Catarata.

20. N. N., de cinco años, natural y procedente de Bogotá (mujer).

Datos importantes. La enfermita alcanzó a ver por ambos ojos durante los dos primeros años de su vida.

Diagnóstico. Catarata congenital doble.

Pronóstico. La sensación luminosa es normal en ambos ojos.

Tratamiento. Se practicaron varias intervenciones: la primera (mayo 24 de 1918) consistió en la extracción simple del cristalino izquierdo, previa dilatación de la pupila y con anestesia general. Cicatrización al sexto día. Diez días después tuvo una iridociclitis en el ojo operado, que se le trató con atropina y pomada amarilla, pero quedó una seclusión pupilar que se le operó mes y medio después (julio 15 de 1918), haciéndole una iridectomía superoexterna y sacándole el pus de la cámara anterior (septiembre 9 de 1918). Con anestesia general se operó el O. D.; incisión córnea superior y extracción simple del cristalino derecho. Cicatrización al séptimo día.

Resultado.

O. D.= +10 V=? la edad no permite darse cuenta
O. I.=

21. N. N., de treinta y cinco años, natural del Espinal, procedente de Ibagué, soltero, jornalero.

Datos importantes. Su enfermedad proviene de una conjuntivitis probablemente de origen blenorrágico.

Diagnóstico. Opacidad central de la córnea del O. I., proveniente de una cicatriz. Hipertrofia bilateral de la glándula tiroides.

Pronóstico. Bueno para el O. I.

Tratamiento (mayo 28 de 1918). Con anestesia local se operó el O. I. Incisión córnea inferoexterna e iridectomía óptica en el mismo punto. Cicatrización el séptimo día. Tuvouna iritis que cedió a la atropina y la pomada amarilla,

Resultado. Restablecimiento de la visión por la pupila artificial.

22. N. N., de cincuenta y cuatro años, natural y procedente de Bogotá, casada, guarnecedora.

Datos importantes. El origen de su enfermedad actual fue el desprendimiento agudo de la retina del O. I.

Diagnóstico. Glaucoma secundario por desprendimiento de la retina del O. I.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (junio 14 de 1918). Con anestesia local se operó el O. I: incisión córnea superior e iridectomía antiglaucomatosa en tres tiempos. Cicatrización al octavo día.

Resultado. Desaparición de los fenómenos de hipertensión.

23. N. N., de quince años, natural y procedente de Bogotá, soltero, albañil.

Datos importantes. La intervención sobre el O. D. se encuentra entre las del iris de la estadística anterior.

Diagnóstico. Opacidades de ambas córneas consecutivas a una queratitis intersticial doble de origen específico hereditario.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento. La segunda intervención se le practicó en junio 18 de 1918; O. I.: con anestesia local se practicó una iridectomía óptica inferoexterna. Cicatrización al sexto día.

Resultado. Restablecimiento de la visión por la pupila artificial.

24 N. N., de cuarenta años, natural y procedente de Bogotá, soltera, cajera.

Datos importantes. Su enfermedad le fue ocasionada por el trautismo producido por la proyección de fragmentos de vidrio.

Diagnóstico. Herida penetrante de la córnea izquierda, complicada de iritis y catarata traumáticas.

Pronóstico. Sumamente reservado.

Tratamiento (julio 4 de 1918). Con anestesia local se operó el ojo enfermo: se hizo una incisión ínferointerna, por debajo de la herida; se practicó la resección del iris en este sitio, y se cauterizó la herida córnea del traumatismo con puntos de fuego. Cicatrización al décimo día.

Resultado. Los fenómenos de iridociclitis desaparecieron, y fue posible dejar en su lugar el ojo, aunque sin visión, por la catarata traumática que ya se había formado.

25. N. N., de treinta y cinco años, natural de Tensa, procedente de San Juan de Ríoseco, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata juvenil doble.

Pronóstico. La sensación a la luz es normal.

Tratamiento. Se practicaron dos intervenciones (julio 12 de 1918). Con anestesia local se operó el O. I., incisión córnea superior y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al séptimo día (agosto 9 de 1918). Igualmente con anestesia local se operó el O. D. Incisión córnea superior y extracción combinada del núcleo central del cristalino; las masas se extrajeron con la cureta. Cicatrización al octavo día En este ojo tuvo una ligera reacción del iris, que cedió a la atropina y pomada amarilla.

Resultado.

O. D. = +9° V = $\frac{5}{7}$
O. I. = +10

26. N. N., de sesenta y dos años, natural y procedente del Chaparal, casado, agricultor.

Datos importantes. Acusa entre los antecedentes un traumatismo del O. I., causado por un latigazo.

Diagnóstico. Catarata senil del O. D., y catarata infecciosa (negra) del O. I.

Pronóstico. Reservado para el O. I. El O. D. reacciona normalmente a la luz.

Tratamiento. Se practicaron varias intervenciones, de las cuales una corresponde al número de las observaciones de intervenciones sobre el globo ocular. El día 12 de julio de 1918 se operó el O. I.: incisión córneoconjuntival superior, separación de las sinequias del iris, iridectomía y extracción del cristalino con el asa de cuerpos extraños. No salió vítreo. Cicatrización al décimo día. Después se le formó un absceso de la córnea, que se le abrió el día 2 de agosto siguiente y se extrajo el pus con la cureta. Cicatrización al octavo día. Tuvo después una conjuntivitis de Weecks complicada de iridociclitis en este mismo ojo, por lo cual se resolvió enuclearlo con anestesia general. El día 16 de octubre de 1918 se operó el O. D.: incisión córneoconjuntival superior e iridectomía previa como primer tiempo de la extracción del cristalino y en previsión de una hemorragia expulsiva. Cicatrización al quinto día.

Resultado. Aún no se le ha hecho la extracción del cristalino por no estar completamente opaco.

27. N. N., de cuarenta y tres años, natural y procedente de Vélez, casado, agricultor.

Datos importantes. Hace seis años le operaron su catarata del O. D., pero tuvo una iridociclitis postoperatoria que anuló la visión.

Diagnóstico. Catarata senil del O. I. e iridociclitis crónica postoperatoria del O. D.

Pronóstico. Enucleando el O. D., bueno para el O. I., que es normalmente sensible a la luz.

Tratamiento. La primera intervención se practicó sobre el O. D. (Véase observación número de las intervenciones sobre el globo). La segunda (julio 29 de 1918) en el O. I.: incisión córneoconjuntival superior y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al séptimo día.

Resultado.

O. D.= Ojo artificial
O. I.=+11° $V=\frac{5}{20}$

28. N. N., de treinta y cinco años, natural y procedente de Bogotá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ya había sido operada para su O. D. (Véanse las observaciones de las intervenciones en el cristalino, de la estadística anterior).

Diagnóstico. Catarata juvenil doble. O. D. operado.

Pronóstico. Ambos ojos son normalmente sensibles a la luz.

Tratamiento (julio 29 de 1918). Con anestesia local se operó el O. I.: previa dilatación de la pupila se hizo una incisión córnea superior, y extracción simple del núcleo central del cristalino; las masas se extrajeron con la cureta. Cicatrización al séptimo día.

Resultado.

O. D.= $V = \frac{5}{7}$ $\frac{50}{:}$
O. I.=+9°

29. N. N., de sesenta años, natural y procedente del Chaparral, soltera y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. La evolución de su enfermedad ha sido sumamente lenta.

Diagnóstico. Glaucoma crónico doble; catarata glaucomatosa del O. I.

Pronóstico. O. D. absolutamente insensible a la luz. O. I. sensación luminosa retardada, por lo tanto de pronóstico reservado.

Tratamiento. Se practicaron dos intervenciones. La primera (agosto 16 de 1918), previa instilación por varios días del colirio fuerte de eserina, se practicó en una sola sesión, con anestesia local, una iridectomía antiglaucomatosa en tres tiempos en ambos ojos. Cicatrización al noveno día. La segunda (noviembre 2 de 1918) consistió en la extracción del cristalino izquierdo con anestesia local. La cicatrización se demoró más de quince días por la interposición entre los labios de la herida de una hernia del vítreo, que hubo necesidad de extirparla quirúrgicamente, aprovechando esta intervención para sacar unas pocas masas opacas de cristalino que quedaban; en esta última vez la cicatrización se verificó al séptimo día.

Resultado.

O. D.= Amaurosis V.= $\frac{5}{25}$
O. I.=+13°

30. N. N., de diez y nueve años, natural y procedente de Bogotá, soltera y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Su enfermedad le provino de una conjuntivitis de Wecks.

Diagnóstico. Opacidad central de la córnea izquierda, que impide la visión.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (agosto 22 de 1918). Con anestesia general se operó el O. I.: incisión córneoconjuntival inferoexterna e iridectomía en el mismo punto. Cicatrización al cuarto día.

Resultado. La visión del O. I. se recuperó por la pupila artificial.

31. N. N., de cuarenta y dos años, natural de Fontibón, procedente de Bogotá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. El origen de la enfermedad del O. D. fue una escleritis, y el de la del O. I. una quemadura.

Diagnóstico. Opacidades centrales de ambas córneas.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (agosto 28 de 1918). Con anestesia local se operó el O. I.: incisión córneoconjuntival superoexterna e iridectomía óptica en el mismo sitio. Cicatrización al quinto día.

Resultado. La visión del O. I. mejoró notablemente por la pupila artificial.

32. N. N., de sesenta y tres años, natural y procedente de Soatá, soltero, agricultor.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble; más avanzada en el O. D.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento (septiembre 2 de 1918). Con anestesia local se operó el O. D.: incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al quinto día. Tuvo una ligera iritis, que cedió en pocos días a la atropina.

Resultado.

O. D. = +10° V = $\frac{5}{10}$
O. I. = Catarata

33. N. N., de sesenta y un años, natural de Liorna (Toscana, Italia), procedente de Bogotá, casado, comerciante.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil del O. D.; úlcera de la córnea del O. I.

Pronóstico. El O. D. reacciona normalmente a la luz; la úlcera de la córnea del O. I. está en vía de regresión.

Tratamiento. Después de tratar la úlcera hasta su cicatrización, se operó el O. D. con anestesia local (septiembre 6 de 1918): incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del núcleo central del cristalino; las masas se extrajeron con la cureta. Cicatrización al quinto día.

Resultado.

O. D. = +11° V = $\frac{5}{20}$
O. I. = O. D.

34. N. N., de sesenta años, natural de Miraflores, procedente de Bogotá, soltera, cocinera

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble; más avanzada en el O. D.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento (septiembre 9 de 1918). Con anestesia local se operó el O. D.: incisión córneo-conjuntival superointerna y extracción combinada del núcleo central del cristalino; salió una pequeña cantidad del vítreo. Cicatrización al sexto día.

Resultado.

O. D. = +12
O. I. = Catarata $V = \frac{5}{15}$

35. N. N., de sesenta años, natural de Natagaima, procedente de Icononzo, soltera, jornalera.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento. Se practicaron dos intervenciones: la primera (septiembre 2 de 1918), extracción combinada del cristalino derecho; cicatrización al octavo día. La segunda (octubre 16 de 1918), extracción combinada del cristalino izquierdo; cicatrización al séptimo día. Ambas con anestesia local.

Resultado.

O. D. = +11°
O. I. = + 9° $V = \frac{5}{15}$

36. N. N., de cincuenta y cuatro años, natural y procedente de Bogotá, viuda, indigente.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento. Se practicaron dos intervenciones: la primera (septiémbre 18 de 1918), O. D.: incisión córnea superior y extracción combinada del cristalino; salió una pequeña cantidad del vítreo. Cicatrización al décimoquinto día. Retardó la cicatrización una hernia del iris que hubo necesidad de resecar y aplicar puntos de fuego en la herida córnea. La segunda (noviembre 17 de 1918), en el O. I.: con anestesia local, lo mismo que la anterior, se hizo la extracción combinada del cristalino. Cicatrización al décimoquinto día, por una ligera reacción del iris que cedió a la atropina.

Resultado.

$$\begin{matrix} O.\ D. = \\ O.\ I. = \end{matrix} +12^{v} \qquad V = \frac{5}{10}$$

37. N. N., de ochenta y cuatro años, natural de Tunja, procedente de Bogotá, viuda y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble; más avanzada en el O. D.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento (octubre 10 de 1918). Con anestesia local se operó el O. D.: incisión córnea superior y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al séptimo día. Tuvo una ligera reacción del iris que cedió en pocos días a la homatropina.

Resultado.

O. D. = +10° V = $\frac{5}{20}$
O. I. = Catarata.

38. N. N., de sesenta y dos años, natural de La Mesa, procedente de Facatativá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Su enfermedad, de crónica que era, se transformó súbitamente en aguda.

Diagnóstico. Glaucoma crónico del O. I. transformado en agudo.

Pronóstico. Reservado, como el de todo glaucoma.

Tratamiento. Después de quince días de aplicación continua del colirio fuerte de eserina hasta que la pupila se hizo puntiforme, se practicó, el 3 de noviembre de 1918, con anestesia local, y después de incisión córnea superior, una iridectomía antiglaucomatosa en tres tiempos. Cicatrización al quinto día.

Resultado. Desaparición de los signos glaucomatosos y baja de la tensión.

39. N. N., de cincuenta y nueve años, natural de La Mesa, procedente de Bogotá, casado, escritor público (véase observación número .. de la estadística anterior).

Datos inportantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil del O. I.; el O. D. operado.

Pronóstico. El ojo para operar reacciona normalmente a la luz.

Tratamiento (diciembre 6 de 1918). Con anestesia local se operó el O. I. Incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al sexto día.

Resultado.

O. D.=
O. I.=+ 9° $V=\frac{5}{7}$

40. N. N., de sesenta y siete años, natural de Chiquinquirá, procedente de Tunja, viudo, abogado.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento. Se practicaron dos intervenciones: la primera (diciembre 17 de 1918) en el O. I.: incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al quinto día. La segunda (abril 25 de 1919) en el O. D.: incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al quinto día.

Resultado.

O. D.=+10° $V=\frac{5}{7.50}$
O. I.=+11°

41. N. N., de diez y ocho años, natural de Guayabal, procedente de Mosquera, soltero, estudiante.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata juvenil doble.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento. Se practicaron dos intervenciones. La primera (diciembre 18 de 1918), con anestesia local en el O. D.: previa instilación de atropina hasta obtener la completa dilatación de

la pupila, se hizo una incisión córnea superior y extracción simple del cristalino. Cicatrización al quinto día. La segunda (enero 31 de 1919), igualmente con anestesia local, en el O. I.: dilatación de la pupila con atropina, incisión córnea superior y extracción simple del cristalino. Cicatrización al sexto día.

Resultado.

$$\begin{matrix} O.\ D.= \\ O.\ I.= \end{matrix} +11^{o} \quad V = \frac{5}{25}$$

42. N. N., de setenta y ocho años, natural de Tunja, procedente de Bogotá, viuda y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. En el ojo que se le operó ya le habían practicado una iridectomía previa.

Diagnóstico. Catarata senil doble.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento (diciembre 21 de 1918). Con anestesia local se operó el O. D.: incisión córneoconjuntival superior; apenas se rompió la cristaloide anterior con el quistítomo, la enferma cerró los párpados sobre el blefarostato produciendo la proyección del cristalino y de unos 2 centímetros del vítreo. Cicatrización al octavo día.

Resultado.

$$\begin{matrix} O.\ D.=+13 \\ O.\ I.=\text{Catarata} \end{matrix} \qquad V=\frac{5}{20}$$

43. N. N., de cuarenta y dos años, natural de Sonsón, procedente de Ibagué, casado, sepulturero.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble; más avanzada en el O. D.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento (diciembre 24 de 1918). Con anestesia local se operó el O. D: incisión córneoconjuntival superior y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al quinto día.

Resultado.

O. D. = +10° V = $\frac{5}{15}$
O. I. = Catarata

44. N. N., de sesenta y dos años, natural y procedente de Bogotá, soltera, costurera.

Datos importantes. Había sido operada de catarata (véanse las observaciones de las intervenciones en el cristalino de la estadística anterior).

Diagnóstico. Catarata secundaria del O. D.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (enero 8 de 1919). Con anestesia local se operó el ojo enfermo; incisión córneoconjuntival superior y arrancamiento de la cristaloide opaca. Cicatrización al quinto día.

Resultado. Reaparición de la visión.

45. N. N., de setenta y dos años, natural de San Juan, procedente de Bogotá, viuda y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Es diabética.

Diagnóstico. Catarata senil doble; más avanzada en el O. D.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento (enero 8 de 1919). Con anestesia local se operó el O. D.: incisión córnea superior y extracción combinada del cristalino, que era quístico. Cicatrización al séptimo día.

Resultado.

O.D.=+ 10° V=$\frac{5}{10}$
O. I.=Catarata.

46. N. N., de setenta y siete años, natural de Leiva, procedente de Bogotá, viudo, tapicero.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble; más avanzada en el O. D.

Pronóstico. Ambos ojos son normalmente sensibles a la luz.

Tratamiento (enero 31 de 1919). Con anestesia local se operó el O. D.: incisión córnea superior y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al séptimo día.

Resultado.

O. D.=+1°2 V =$\frac{5}{25}$
O. I.=Catarata

47. N. N., de veinticinco años, natural y procedente de Bogotá, soltera, guarnecedora.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata juvenil del O. D.

Pronóstico. El ojo enfermo reacciona normalmente a la luz.

Tratamiento (febrero 18 de 1919). Previa dilatación al máximum de la pupila, se operó el O. D. con anestesia local: incisión córnea superior y extracción simple del cristalino; las masas restantes se extrajeron con la cureta; salió una

cantidad insignificante de vítreo. Cicatrización al séptimo día.

Resultado.

$$\begin{array}{l} O.\ D. = +9^{\circ} \\ O.\ I. = O.\ D. \end{array} \quad V = \frac{5}{7}$$

48. N. N., de cuarenta y cinco años, natural y procedente de Bogotá, viuda y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ha sido operada para catarata senil doble.

Diagnóstico. Catarata secundaria del O. I.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (febrero 5 de 1919). Con anestesia local se hizo el arrancamiento de la cristaloide opaca. Cicatrización al sexto día.

Resultado. Reaparición de la visión.

49. N. N., de sesenta años, natural de Funza, procedente de Bogotá, casada, sirvienta.

Datos importantes. Fue operada para catarata senil del O. D.

Diagnóstico. Catarata secundaria del O. D.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (marzo 7 de 1919). Con anestesia local se hizo el arrancamiento de la cristaloide opaca. Cicatrización al octavo día.

Resultado. Reaparición de la visión.

50. N. N., de veinticuatro años, natural y procedente de Zipaquirá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Hace tres meses tuvo una iridociclitis del O. I. consecuencial a una úlcera de la córnea, de origen conjuntival.

Diagnóstico. Glaucoma secundario del O. I.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (mayo 7 de 1919). Con anestesia local se operó el ojo enfermo: incisión córneoconjuntival superior e iridectomía antiglaucomatosa en tres tiempos. Cicatrización al quinto día.

Resultado. Desaparición de los signos glaucomatosos.

51. N. N., de cuarenta y cinco años, natural y procedente de Choachí, casado, agricultor.

Datos importantes. El origen de su enfermedad fue una conjuntivitis, probablemente de Weecks, que le ulceró la córnea del O. I.

Diagnóstico. Opacidad central de la córnea del O. I., cicatriz de una úlcera.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (marzo 21 de 1919). Con anestesia local se operó el O. I.: incisión córnea superior e iridectomía óptica en el mismo sitio. Cicatrización al octavo día.

Resultado. Reaparición de la visión del O. I.

52. N. N., de treinta y dos años, natural y procedente de Bogotá, casada, costurera.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Glaucoma agudo del O. I.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento. Después de instilar inútilmente por espacio de más de diez días el colirio fuerte de eserina, y en vista de que la pupila no cedía, se resolvió operar el O. I.: incisión córneoconjuntival superior e iridectomía antiglaucomatosa en tres tiempos. Cicatrización al quinto día.

Resultado. Desaparición de los signos glaucomatosos.

53. N. N., de sesenta y dos años, natural y procedente de Bogotá, viudo, albañil.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble; más avanzada en el O. I.

Tratamiento. Visto el buen estado del fondo del ojo, se operó el día 25 de abril de 1919: incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al quinto día.

Resultado.

O. D. = +7 D. $V = \frac{5}{7}$
O. I. = catarata.

54. N. N., de setenta y dos años, natural y procedente de Vélez, casado, comerciante.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Catarata senil doble.

Pronóstico. Ambos ojos reaccionan normalmente a la luz.

Tratamiento (abril 27 de 1919). Con anestesia local se operó el O. D.: incisión córneoconjuntival superointerna y extracción combinada del cristalino. Cicatrización al sexto día.

Resultado.

O. D. = + $V = \frac{5}{5}$
O. I. = catarata

INTERVENCIONES SOBRE EL RESTO DEL GLOBO OCULAR

55. N. N., de sesenta y dos años, natural y procedente de Bogotá, soltero, cantero.

Datos importantes. Tuvo una iridociclitis traumática del O. D.

Diagnóstico. Iridociclitis traumática del O D. con ligeros signos simpáticos del O. I.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (mayo 3 de 1918). Con anestesia general se enucleó el O. D.

Resultado. Desaparición de los signos simpáticos del O. I.

56. N. N., de treinta y cinco años, natural del Socorro, procedente de Bogotá, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Varias veces se ha cauterizado el tumor y se ha vuelto a reproducir.

Diagnóstico. Glicoma de la conjuntiva bulbar del O. I.

Pronóstico. Reservado, por ser maligno el tumor.

Tratamiento (mayo 20 de 1918). Con anestesia general se enucleó el O. I., teniendo cuidado de resecar toda la conjuntiva enferma.

Resultado. El tumor no se ha vuelto a reproducir.

57. N. N., de veintinueve años, natural del Agrado, procedente de Florencia, casado, agricultor.

Datos importantes. Su enfermedad le provino de un traumatismo.

Diagnóstico. Iridociclitis traumática del O. I.

Pronóstico. El ojo está perdido para la visión.

Tratamiento (mayo 24 de 1918). Con anestesia general se enucleó el O. I.

Resultado. El O. D. mejoró notablemente de visión.

58. N. N., de ochenta y cuatro años, natural y procedente de Bogotá, soltera y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Su infección ocular fue causada por la instilación diaria de miel de abejas como tratamiento médico para la catarata.

Diagnóstico. Iridociclitis infecciosa del O. I. complicada de ligeros signos simpáticos del O. D.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (junio 14 de 1918). Con anestesia general por el cloroformo se hizo la enucleación del O. I.

Resultado. Los signos simpáticos del O. D. desaparecieron inmediatamente.

59. N. N., de sesenta y dos años, natural y procedente de Chaparral, casado, agricultor. (Véase observación número 26 de las intervenciones sobre el iris y el cristalino).

Datos importantes. La enfermedad apareció a los dos meses después de operado del O. I

Diagnóstico. Iridociclitis del O. I. de origen traumático.

Pronóstico. El ojo está perdido para la visión.

Tratamiento (septiembre 6 de 1918). Con anestesia general se enucleó el O. I.

Resultado. Terminó el peligro latente para la operación del O. D.

60. N. N., de cuarenta y tres años, natural y procedente de Vélez, casado, agricultor (Véase observación número 27 de las intervenciones sobre el cristalino).

Datos importantes. El O. D. había sido operado tres años antes para una catarata senil.

Diagnóstico. Iridociclitis postoperatoria del O. D.

Pronóstico. El ojo derecho está perdido para la visión.

Tratamiento (julio 15 de 1918). Con anestesia local por la cocaína se enucleó el O. D.

Resultado. La intervención en el O. I. se pudo practicar con seguridad.

61. N. N., de cuarenta y tres años, natural y procedente de Zipaquirá, casado, negociante.

Datos importantes. Es específico.

Diagnóstico. Iridociclitis específica del O. I. complicada de ligeros signos simpáticos del O. D.

Pronóstico. El O. I. está perdido para la visión.

Tratamiento (julio 24 de 1918). Con anestesia general se operó el O. I., enucleación).

Resultado. Desaparición de los signos del O. D.

62. N. N., de cuarenta y tres años, natural y procedente de San Martín, viudo, jornalero.

Datos importantes. Es específico.

Diagnóstico. Iridociclitis específica del O. D. con ligeros signos simpáticos del O. I.

Pronóstico. El O. D. está perdido para la visión.

Tratamiento (agosto 9 de 1918). Con anestesia general se enucleó el O. D.

Resultado. Desaparición de los signos del O. I.

63. N. N., de ocho años de edad, mujer, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ha sido operada de catarata congenital doble.

Diagnóstico. Iridociclitis crónica postoperatoria del O. I.

Pronóstico. El O. I. casi está completamente perdido para la visión.

Tratamiento (agosto 30 de 1918). Con anestesia general se enucleó el O. I.

Resultado. Desapareció el peligro latente para el otro ojo.

64. N. N., varón, de nueve años, natural y procedente de Colombia.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Glaucoma congentinal doble; el O. D. perdido para la visión.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento. Como tratamiento preventivo se hizo la enucleación del O. D. con anestesia general (septiembre 12 de 1918).

Resultado. Desaparición del peligro para el O. I.

65. N. N, de sesenta y cuatro años, natural de Ambalema, procedente de Vianí, viuda y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Su enfermedad es de origen conjuntival.

Liagnóstico. Iridociclitis gonocóccica del O. D.

Pronóstico. El O. D. está perdido para la visión.

Tratamiento (octubre 4 de 1918). Con anestesia general se enucleó el ojo enfermo.

Resultado. Desaparición del peligro para el O. I.

66. N. N., de treinta años, natural y procedente de Bogotá, soltero, albañil.

Datos importantes, Su enfermedad es de origen traumático.

Diagnóstico. Iridociclitis traumática del O. I. complicada de signos simpáticos del O. I.

Pronóstico. El O. D. está perdido para la visión.

Tratamiento (octubre 4 de 1918). Con anestesia general se enucleó el O. D.

Resultado. Desaparición de los signos del O.I.

67. N.. N, mujer, de ocho años, natural y procedente de Bogotá. (Véanse observaciones de las intervenciones en el globo, de la estadística anterior).

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Ruptura de la sutura conjuntival hecha por encima del muñón.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (octubre 17 de 1918). Para evitar una infección de las membranas se resolvió hacer la enucleación del segmento posterior del O. D.

Resultado. Se pudo adaptar convenientemente un ojo artificial.

68. N. N., de trece años, natural de Susa, procedente de Bogotá, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Iridociclitis del O. D. consecuencial a una infección crónica de la córnea, probablemente de origen blenorrágico, complicada de ligeros signos simpáticos del O. I.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (octubre 25 de 1918). Con anestesia general se enucleó el O. D.

Resultado. Desaparición de los fenómenos simpáticos del O. I.

69. N. N., de cincuenta y nueve años, natural y procedente de Anapoima, casado, albañil.

Datos importantes. Su enfermedad es de origen traumático.

Diagnóstico. Iridociclitis traumática del O. I.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (noviembre 20 de 1918). Con anestesia general se enucleó el O. I.

Resultado. Desaparición del peligro latente para el O. D.

70. N. N., de cuarenta y ocho años, natural y procedente del Chaparral, soltero, jornalero.

Datos importantes. Su enfermedad es de origen traumático.

Diagnóstico. Iridociclitis traumática del O. I. y glaucoma secundario del O. D. por iritis simpática.

Pronóstico. Reservado para el O. D.

Tratamiento. Se principió por enuclear el O. I. con anestesia general (diciembre 5 de 1918), y luégo se practicó una iridectomía antiglaucomatosa en tres tiempos en el O. D.

Resultado. La tensión del O. D. bajó y desaparecieron los demás signos glaucomatosos.

71. N. N., de veintinueve años, natural y procedente de La Palma, casado, agricultor.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Iridociclitis específica (?) del O. I. que por simpatía se transmitió al O. D. y

fue seguida en este último de signos glaucomatosos y de coroiditis anterior.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (enero 30 de 1919). Con anestesia general se enucleó el O. I.

Resultado. Los signos glaucomatosos del O. D. desaparecieron.

72. N. N., de treinta y cinco años, natural y procedente de Bogotá, casada, sirvienta.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Iridociclitis del O. D. de origen gonocóccico, complicada de fenómenos simpáticos del O. I.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (febrero 13 de 1919). Con anestesia general por el cloroformo se enucleó el O. D.

Resultado. Desaparecieron los fenómenos simpáticos del O. I.

73. N. N., de treinta años, natural y procedente de Une, casado, agricultor.

Datos importantes. El traumatismo fue causa de su enfermedad hace catorce años.

Diagnóstico. Iridociclitis traumática del O. D. complicada de fenómenos simpáticos del O. I.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (marzo 27 de 1919). Con anestesia general por el cloroformo se practicó la enucleación del O. D.

Resultado. Desaparición de los fenómenos simpáticos del O. I.

74. N. N., de treinta años, natural y procedente de Zipaquirá, casada, costurera.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Iridociclitis aguda blenorrágica del O. D.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (abril 6 de 1919). Con anestesia general se enucleó el O. D.

Resultado. Desaparición del peligro latente para el O. I.

75. N. N., de treinta y cinco años, natural del Agrado, procedente de Bogotá, casado, comerciante.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Iridociclitis del O. D. consecuencial a una conjuntivitis gripal.

Pronóstico. El O. I. es un ojo ambiope, miope y con cicatrices de coroiditis.

Tratamiento (abril 11 de 1919). Con anestesia general se enucleó el O. D.

Resultado. Desaparición del peligro latente para el O. I., que es un órgano mal conformado.

INTERVENCIONES EN LA RINOFARINGE, EL OÍDO Y OTRAS REGIONES

76. N. N., de diez y ocho años, natural y procedente de Tensa, soltero, negociante.

Datos importantes. Su enfermedad es congenital.

Diagnóstico. Procidencia de la mucosa del labio superior.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento. Para quitar el feo defecto se operó con anestesia general; se resecó la mucosa procidente sacando dos triángulos de base media y se suturaron los bordes con catgut.

Resultado. Desaparición de la deformidad.

77. N. N., mujer, de ocho años, natural y procedente de Cajicá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas e hipertrofia bilateral de las amígdalas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento. Con anestesia general por el bromuro de etilo se rasparon las vegetaciones y se resecaron las amígdalas (mayo 8 de 1919).

Resultado. Curación.

78. N. N., varón, de ocho años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas e hipertrofia bilateral crónica de las amígdalas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (mayo 20 de 1919). Con anestesia general por el bromuro de etilo se rasparon las vegetaciones y se resecaron las amígdalas; hubo hemorragia postoperatoria abundante que cedió espontáneamente.

Resultado. Curación.

79. N. N., mujer, de cuatro meses, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Labio leporino simple unilateral derecho.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (junio 3 de 1918). Con anestesia general se operó por el procedimiento de Mirault, poniendo tres puntos de sutura.

Resultado. Curación.

80. N. N., de veintiséis años, natural y procedente de Bogotá, casado, artista (cantor).

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Amigdalitis hipertrófica bilateral crónica.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (junio 17 de 1918). Con anestesia general por el cloruro de etilo se resecaron las glándulas.

Resultado. Curación.

81. N. N., varón, de siete años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia de los cornetes inferiores, vegetaciones adenoides retrofaríngeas y amigdalitis hipertrófica bilateral crónica.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (junio 19 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se extirparon las glándulas hipertrofiadas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

82. N. N., mujer, de tres y medio años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (junio 19 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

83. N. N., de cuarenta y dos años, natural y procedente de Mosquera, casado, jornalero.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Otitis media izquierda supurada, aguda, complicada de mastoiditis.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (julio 5 de 1918). Con anestesia general se hizo la trepanación de la mastoides y se drenó el antro.

Resultado. Los dolores de oído mejoraron enormemente, pero repentinamente se presentó una tromboflebitis supurada del seno lateral que mató al enfermo.

84. N. N., de cuarenta años, natural de Zipaquirá, procedente de Bogotá, casado, empleado público.

Datos importantes. Ya fue operado una vez antes para el mismo tumor, que actualmente se ha reproducido una tercera vez (mayo de 1919).

Diagnóstico. Tumor maligno del piso de la nariz izquierda.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (julio 5 de 1919). Con anestesia local se operó por segunda vez el tumor, teniendo cuidado de raspar bien el piso hasta el hueso.

Resultado. Ya se dijo que el tumor se ha vuelto a reproducir por tercera vez.

85. N. N., de cincuenta y seis años, natural y procedente de Bogotá, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Neuralgia crónica del nervio infraorbital izquierdo.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (julio 15 de 1918). Se practicó una inyección de alcohol absoluto en el tronco del nervio.

Resultado. Curación.

86. N. N., de veinticinco años, natural y pro-

cedente de Barranquilla, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas e hipertrofia bilateral de los cornetes inferiores.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (julio 15 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se rasparon las vegetaciones. Ocho días después, con anestesia local, se resecó la parte hipertrofiada de los cornetes.

Resultado. Curación.

87. N. N., mujer, de doce años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia bilateral crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (julio 30 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se rasparon las vegetaciones y se resecaron las amígdalas.

Resultado. Curación.

88. N. N., mujer, de once años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno,

Diagnóstico. Hipertrofia bilateral crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides retrofaríngéas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (agosto 16 de 1918), Con anestesia general por el bromuro de etilo se extirparon las amígdalas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

89. N. N., de veintidós años, natural y procedente de Vélez, soltera, costurera.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia del lóbulo medio de la glándula tiroides (coto quístico).

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (agosto 29 de 1918). Con anestesia general se extirpó el lóbulo hipertrofiado de la glándula.

Resultado. Curación.

90. N. N., mujer, de nueve años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia bilateral crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (septiembre 2 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se hizo la extirpación de las amígdalas hipertrofiadas, y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

91. N. N., de cuarenta y tres años, natural de Vélez, procedente de Bogotá, viuda y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ha sido operada por tres veces.

Diagnóstico. Rinoescleroma reincidente.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (septiembre 3 de 1918). Con anestesia general se rasparon completamente los tejidos enfermos y se quemó con el termocauterio el sitio de su implantación.

Resultado. Restablecimiento de la respiración nasal.

92. N. N., varón, de diez años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia bilateral de las amígdalas y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (septiembre 17 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se rasparon las vegetaciones y se extirparon las amígdalas hipertrofiadas.

Resultado. Curación.

93. N. N., varón, de tres años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (septiembre 27 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

94. N. N., varón, de cinco años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia bilateral de las amígdalas y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (septiembre de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se resecaron las amígdalas hipertrofiadas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

95. N. N., mujer, de ocho años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (septiembre 29 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se resecaron las amígdalas hipertrofiadas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

96. N. N., varón, de siete años, natural y procedente de Ibagué.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia crónica bilateral de las amígdalas y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (octubre 10 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se resecaron las amígdalas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

97. N. N., de diez y ocho años, natural y procedente de Bogotá, soltera.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Coto quístico.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (noviembre 15 de 1918). Con anestesia general por el cloroformo se practicó la extirpación del tumor. Curación por primera intención.

Resultado. Curación.

98. N. N., de veintiocho años, natural y procedente de Coello, soltero, agricultor.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Ganglio tuberculoso supurado de la región laterosuperior izquierda del cuello.

Pronóstico. Reservado a causa de la naturaleza de la afección.

Tratamiento (noviembre 16 de 1918). Con anestesia general se hizo la extirpación del ganglio.

Resultado. Después de quince días de curaciones la herida cerró.

98. N. N., de cuarenta años, natural del Agrado, procedente de Bogotá, soltero, agricultor.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Amigdalitis criptosa crónica.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (noviembre 26 de 1918). Con anestesia local se hizo la extirpación de ambas amígdalas.

Resultado. Curación.

100. N. N., mujer, natural y procedente de Facatativá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Amigdalitis hipertrófica crónica y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (diciembre 6 de 1918). Con anestesia general por el cloruro de etilo se extirparon las amígdalas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

101. N. N., mujer, de seis años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (diciembre 19 de 1918). Con anestesia general por el cloruro de etilo se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

102. N. N., mujer, de doce años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. La otitis fue de origen gripal.

Diagnóstico. Otitis media izquierda complicada de mastoiditis.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (diciembre 19 de 1918). Con anestesia general por el cloroformo se hizo la trepanación de la mastoides, se evacuó el pus y se drenó el antro.

Resultado. Curación.

103. N. N., de treinta y un años, natural de Puente Nacional, procedente de Bogotá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Tiene una otitis media crónica.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (diciembre 24 de 1918). Con anestesia general por el bromuro de etilo se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Sensible mejoría de la otitis media crónica.

104. N. N., de diez y ocho años, natural y procedente de Guatavita, soltero, agricultor.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia bilateral crónica de las amígdalas, vegetaciones adenoides retrofaríngeas e hipertrofia de los cornetes inferiores.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento. Se operó en dos sesiones: la primera (enero 15 de 1919) consistió en la extirpación de las amígdalas y el raspado de las vegetaciones con anestesia general por el cloruro de etilo; la segunda (enero 22 de 1919), resección de la parte hipetrofiada de los cornetes inferiores con anestesia local.

Resultado. Curación.

105. N. N., de veintidós años, natural y procedente de Subachoque, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Su enfermedad la observó desde pequeña.

Diagnóstico. Rinoescleroma.

Pronóstico. Reservado a causa de la posible reproducción.

Tratamiento (enero 15 de 1919). Con anestesia general por el cloroformo se raspó el tumor y se destruyó con el termocauterio.

Resultado. Desostrucción de las narices.

106. N. N., varón, de ocho años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Amigdalitis hipertrófica crónica y vegetaciones adenoides rotrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (enero 23 de 1919). Con anestesia general por el bromuro de etilo se resecaron las amígdalas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

107. N. N., mujer, de siete años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Amigdalitis hipertrófica crónica y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (enero 23 de 1919). Con anestesia general por el cloruro de etilo se extirparon las amígdalas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

108. N. N., de veintiséis años, natural y procedente de Bogotá, soltero, comerciante.

Datos importantes. Es específico.

Diagnóstico. Perforación del paladar a consecuencia de una goma.

Pronóstico. Reservado a causa de la dificultad para pegar la sutura.

Tratamiento (enero 23 de 1919). Con anestesia local se avivaron los bordes de la perforación y se suturaron.

Resultado. Solamente una parte de la perforación se obturó, el resto quedó abierto.

109. N. N., de diez y ocho años, natural de Sesquilé, procedente de Bogotá, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Rinoescleroma.

Pronóstico. Reservado por la posible reproducción.

Tratamiento (enero 15 de 1919). Con anestesia general por cloroformo se raspó el tumor hasta dejar completamente libres las vías aéreas.

Resultado. Desobstrucción de las narices.

110. N. N., varón, de ocho años, natural de Caracas, procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (febrero 3 de 1919). Con anestesia general por el bromuro de etilo se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

111. N. N., de cuarenta y dos años, natural de Susa, procedente de Bogotá, soltero, empleado.

Datos importantes. Su otitis media fue de origen gripal.

Diagnóstico. Mastoiditis aguda izquierda.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (febrero 8 de 1919). Con anestesia general por el cloroformo se trepanó la mastoides y se drenó el antro.

Resultado. Curación a pesar de que la piel se ha supurado.

112. N. N., varón, de doce años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hipertrofia bilateral crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (febrero 26 de 1919). Con anestesia general por el bromuro de etilo se resecaron las amígdalas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

113. N. N., mujer, de ocho años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Es hermana del enfermo anterior.

Diagnóstico. Hipertrofia bilateral crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (febrero 26 de 1919). Con anestesia general por el cloruro de etilo se resecaron las amígdalas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

114. N. N., varón, de siete años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas e hipertrofia bilateral crónica de las amígdalas.

Tratamiento. Con anestesia general por el cloruro de etilo se resecaron las amígdalas y se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

115. N. N., de treinta años, natural de Choachí, procedente de Bogotá, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. *Moluscum* de la parte media de la región frontal.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (febrero 5 de 1919). Con anestesia local se extirpó el tumor; se pusieron tres puntos de sutura con crin.

Resultado. Curación.

116. N. N., mujer, de doce años, natural y procedente de Bogotá.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Vegetaciones adenoides retrofaríngeas.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (febrero 14 de 1919). Con anestesia general por el cloruro de etilo se rasparon las vegetaciones.

Resultado. Curación.

117. N. N., de treinta y seis años, natural de Gachetá, procedente de Bogotá, soltera, sirvienta.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. *Moluscum* de la región frontal media.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (febrero 17 de 1919). Con anestesia local se extirpó el tumor; se pusieron tres puntos de sutura con seda.

Resultado. Curación.

118. N. N., de cuarenta años, natural y procedente de Bogotá, religiosa.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Quiste sebáceo de la región parietal derecha.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (abril 22 de 1919). Con anestesia local se extirpó el tumor; se pusieron tres puntos de sutura con seda.

Resultado. Curación.

INTERVENCIONES EN OTRAS REGIONES, PRACTICADAS EN LA CLÍNICA POR EL DOCTOR RAFAEL UCRÓS

119. N. N., de cincuenta años, natural de Moniquirá, procedente de Tunja, casada, maestra de escuela.

Datos importantes. No ha tenido hijos ni abortos.

Diagnóstico. Anexitis supurada doble.

Pronóstico. Reservado

Tratamiento (mayo 21 de 1918). Con anestesia general por el cloroformo se operó en frío: se practicó la ablación de los anexos, dejando el útero en su lugar. Se dejó una gasa que se retiró a las veinticuatro horas de operada.

Resultado. Curación.

120. N. N., de treinta y seis años, natural y procedente de Bogotá, casada, institutriz.

Datos importantes. Desde el primer parto hubo una ptosis del útero y se infectó crónicamente.

Diagnóstico. Prolapso del útero de tercer grado.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (junio 6 de 1918). Se practicaron dos intervenciones en una misma sesión: primero acortamiento de los ligamentos abdominales del útero, y luégo una colpoperineorrafia posterior con miorrafia de los elevadores del ano.

Resultado. Curación.

121. N. N., de cuarenta y tres años, natural y procedente de Bogotá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Desde hace tres años ha tenido una hemorragia vaginal poco abundante pero constante.

Diagnóstico. Anexitis doble y fibroma uterino.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (agosto 27 de 1918). Con anestesia general se practicó una histerectomía sub-

total con ablación de ambos anexos por el procedimiento americano; se dejó en el fondo de saco de Douglas una gasa que se retiró a las cuarenta y ocho horas.

Resultado. Curación.

122. N. N., de veintidós años, natural de Soatá, procedente de Bogotá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Esterilidad por estenosis del cuello uterino.

Pronóstico. Reservado en cuanto al resultado de la operación.

Tratamiento (agosto 29 de 1918). Con anestesia general por el cloroformo se practicó una estómatoplastia de Pozzi.

Resultado. Aún no ha habido fecundación.

123. N. N., de cincuenta y tres años, natural de Villeta, procedente de Facatativá, viuda y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Desde hace unos seis años ha tenido una metrorragia constante aunque poco abundante.

Diagnóstico. Fibroma uterino.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (septiembre 3 de 1918). Con anestesia general se practicó una histerectomía por el procedimiento de Bazy. Hubo necesidad de hacer una nueva intervención a los diez días para volver a cerrar la cavidad abdominal porque la herida no cicatrizó.

Resultado. La metrorragia cesó después de la operación.

124. N. N., de treinta y ocho años, natural y procedente de Ibagué, soltera, modista.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Fibroma uterino.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (septiembre 5 de 1918). Con anestesia general se extirpó el tumor, que era bilobado (uno de los lóbulos estaba dentro del ligamento úterovariano izquierdo).

Resultado. Curación.

125. N. N., de treinta y ocho años, natural del Agrado, procedente de Neiva, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ha tenido cuatro hijos y un aborto.

Diagnóstico. Anexitis supurada doble.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (septiembre 21 de 1918). Con anestesia general se practicó una histerectomía con ablación de los anexos por el procedimiento americano.

Resultado. Curación.

126. N. N., de cuarenta y ocho años, natural y procedente de La Palma, casado, agricultor.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Hernia inguinal izquierda de origen traumático.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (octubre 5 de 1918). Con anestesia general se hizo la cura radical de la hernia por el procedimiento de Bassini (se practicó la maniobra de Barker).

Resultado. Curación.

127. N. N., de treinta y cinco años, natural y procedente de Pacho, soltera y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Fibroma uterino.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (octubre 10 de 1918). Con anestesia general se practicó una histerectomía subtotal, por el procedimiento americano.

Resultado. Curación.

128. N. N., de treinta y ocho años, natural de Fómeque, procedente de Honda, casada, hotelera.

Datos importantes. No ha tenido hijos.

Diagnóstico. Fibroma uterino y anexitis doble.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (octubre 11 de 1918). Con anestesia general se practicó una histerectomía subtotal, con ablación de los anexos por el procedimiento americano.

Resultado. Curación.

129. N. N., de treinta y seis años, natural de Guaduas, procedente de Bogotá, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Esterilidad por estenosis del cuello.

Pronóstico. Reservado en cuanto al resultado operatorio.

Tratamiento (octubre 17 de 1918). Con anestesia general se practicó una estómatoplastia de Pozzi.

Resultado. Aún no ha habido fecundación.

130. N. N., de cuarenta años, natural y procedente de Chocontá, soltera y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Fibroma uterino.

Pronóstico. Reservado a causa del enorme volumen del tumor.

Tratamiento (diciembre 12 de 1918). Con anestesia general por el cloroformo se practicó una histerectomía subtotal por el procedimiento americano; luégo se hizo la apendicectomía.

Resultado. A las veinticuatro horas de operada la enferma murió por el *schock* operatorio.

131. N. N., de cuarenta y dos años, natural y procedente de Ibagué, soltera y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ha tenido varios ataques de apendicitis.

Diagnóstico. Apendicitis crónica.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (diciembre 12 de 1918). Con anestesia general se practico la apendicectomía.

Resultado. Curación.

132. N. N., de treinta y cinco años, natural de Tunja, procedente de Vélez, soltera y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Fibroma uterino.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (diciembre 27 de 1918). Con anestesia general se practicó una histerectomía subtotal por el procedimiento americano

Resultado. La enferma sucumbió cincuenta y tres horas después de operada, a causa de peritonitis.

133. N. N., de cincuenta y tres años, natural de Paipa, procedente de Bogotá, soltera, costurera.

Datos importantes. Ninguno

Diagnóstico. Adenoma del seno izquierdo.

Pronóstico. Reservado a causa de posible transformación maligna.

Tratamiento (enero 9 de 1919). Con anestesia general se practicó la amputación del seno enfermo, teniendo el cuidado de extirpar con él el tumor.

Resultado. Curación.

134. N. N., de veintinueve años, natural y procedente del Socorro, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Anexitis doble.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (enero 9 de 1919). Con anestesia general se practicó una histerectomía subtotal por el procedimiento americano, con ablación de los anexos izquierdos; el ovario derecho se cauterizó con el termocauterio.

Resultado. Los anexos derechos siempre se supuraron después de esta intervención, por lo cual hay necesidad de extraerlos en una nueva, lo mismo que el cuello uterino para calmar un flujo tenaz que le quedó.

135. N. N., de treinta y nueve años, natural y procedente de Samacá, soltera y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno.

Diagnóstico. Anexitis doble y anteflexión del útero.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (enero 24 de 1919). Con anestesia general se practicó una histerectomía sub-

total por el procedimiento americano, con ablación de los anexos.

Resultado. Curación especialmente de la disuria producida por la anteflexión del útero.

136. N. N., de cuarenta y cinco años, natural de Tunja, procedente de Sogamoso, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Ninguno,

Diagnóstico. Cáncer del cuello uterino.

Pronóstico. Sumamente reservado,

Tratamiento (febrero 14 de 1919). Con anestesia general se practicó una histerectomía total por el procedimiento americano, dejando una gasa vaginal que se retiró a las cuarenta y ocho horas.

Resultado. Curación.

137. N. N., de treinta años, natural y procedente de Bogotá, soltero, empleado público.

Datos importantes. Es específico.

Diagnóstico. Cicatrices pigmentadas de una erupción específica.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento (marzo 27 de 1919). Con anestesia general por éter, se extirparon las cicatrices suturando la piel con catgut (suturas intradérmicas).

Resultado. Desaparición de las cicatrices, pues las nuevas apenas son visibles.

138. N. N., de veintiséis años, natural de Vélez, procedente del Guamo, casada y de profesión oficios domésticos.

Datos importantes. Tuvo un aborto.

Diagnóstico. Metritis fungosa hemorrágica, consecuencial a un aborto.

Pronóstico. Bueno.

Tratamiento. Con anestesia general se practicó un raspado del útero (abril 13 de 1919).

Resultado. Curación.

139. N. N., de doce años, natural de Serrezuela, procedente de Anapoima, estudiante.

Datos importantes. Tiene ganglios infartados en otras regiones como el cuello y la nuca.

Diagnóstico. Ganglios tuberculosos de la región inguinal izquierda, a punto de supurarse.

Pronóstico. Reservado.

Tratamiento (abril 22 de 1919). Con anestesia general se extirparon los ganglios dejando una gasa en el lugar que ocupaban. La supuración terminó a los quince días.

Resultado. Curación.

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES

Suturas de Gaillard	1
Angiomas conjuntivales	1
Pterigios	12
Pingüéculas	1
Dacricistectomías	2
Tatuajes de la córnea	1
Extracciones combinadas del cristalino	26
Extracciones simples del cristalino	7
Arrancamiento de la cristaloide posterior opaca	3
Discisión del cristalino	1
Iridectomías ópticas	7
Iridectomías antiglaucomatosas	6
Resección de hernias del iris	3

Abertura de accesos de la córnea	1
Enucleación del globo ocular	21
Rinoescleromas	3
Resección de la mucosa del labio superior	1
Raspado de vegetaciones adenoides	24
Amigdalotomías	19
Labio leporino	1
Trepanación de la mastoides	3
Extirpación de tumores del piso nasal	1
Inyecciones de alcohol en el nervio infraorbitario	1
Cotos	2
Extirpación de ganglios tuberculosos	2
Resección de cornetes hipertrofiados	2
Estafilorrafias	1
Extirpación de *molucums*	2
Quistes sebáceos (extirpación)	1
Histerectomía subtotal con ablación de los anexos	5
Histerectomía subtotal	5
Histerectomía total	1
Ablación de los anexos	1
Acortamiento de los ligamentos redondos	1
Miorrafia de los elevadores del ano	1
Estomatoplastias de Pozzi	2
Hernias inguinales	1
Apendicectomías	1
Amputaciones del seno	1
Raspados del útero	1
Suturas de la piel	1
Total de intervenciones	177

Fracasos en las cataratas . . .	0	por 100
Mortalidad global	1,6	—
Mortalidad en las intervenciones de los órganos de los sentidos .	0,64	—
Mortalidad en las intervenciones abdominales y otras	9,52	—