

## VARIEDADES

**PREPARACION DEL LIQUIDO DE HIPOCLORITO DE DAKIN**—Esta solución de hipoclorito de soda, que tan buen éxito ha tenido en el tratamiento de las heridas, aconsejado por Carrel y conocido con el nombre de *método abortivo de la infección*, se puede obtener del modo siguiente:

1.º Para preparar 10 litros de la solución, pesar exactamente:

Cloruro de cal.....	200 gramos.
Carbonato de soda seco.....	100 gramos.
Bicarbonato de soda.....	80 gramos.

2.º Introducir los 200 gramos de cloruro de cal en un frasco de capacidad para 12 litros; agregarle 5 litros de agua común; agitar con fuerza dos o tres veces y dejar la mezcla en contacto una noche.

3.º Disolver en otro frasco y en 5 litros de agua fría el carbonato y el bicarbonato de soda.

4.º Mezclar la solución de las sales de soda con el líquido que contiene el cloruro de cal; agitarla con fuerza por un minuto y dejarla en reposo para que se precipite el carbonato de cal que se forma.

5.º Al cabo de media hora se extrae con un sifón el líquido claro y se filtra en papel.

La solución está entonces lista para usarse, y contiene más o menos 0.50 por 100 de hipoclorito de soda y pequeñas cantidades de soda neutra, y es sensiblemente isotónica con el suero sanguíneo.

Se ensaya el líquido así: se ponen 200 centímetros cúbicos de la solución filtrada en un vaso; se ponen en la superficie del líquido algunos centigramos de fenoltaleína *en polvo*; se agita todo imprimiendo al vaso un movimiento circular. El líquido debe quedar incoloro; si toma una coloración roja más o menos intensa, es porque hay álcali libre o incompletamente carbonatado por defecto en la técnica.

Puede decirse que aplicando esta solución por el método de Carrel, el médico domina en absoluto la infección de las heridas. Así lo han declarado los cirujanos militares que han tratado heridos en la guerra europea.

**GARGARISMOS EN LAS ANGINAS DOLOROSAS.**

Los doctores Moure y Brindel recomiendan estos gargarismos:

Antipirina.....	4 gramos.
Borato de soda.....	6 gramos.
Bromuro de potasio.....	3 gramos.
Alcoholatura de menta.....	10 gramos.
Decocción de hojas de coca.....	600 gramos.

Mézclase. Se empleará tibio el líquido.

En las anginas pultáceas aconsejan el siguiente líquido:

R.—Salol.....	5 gramos.
Alcanfor.....	6 —
Acido fénico líquido.....	4 —
Glicerina.....	25 —

M. y R. Colutorio.

Para tocar cada dos o tres horas.

**TRATAMIENTO DE LA SARNA POR EL PETRÓLEO.**

El doctor Fernando Levy describe el siguiente procedimiento empleado en el ejército en muchos casos de sarna.

Se frota todo el cuerpo del enfermo, exceptuando la cabeza, con un guante de hilo empapado en petróleo, cuidando de untar todos los repliegues de los tegumentos sin olvidar la planta del pie y los espacios interdigitales de los dedos.

Veinte minutos después se untará en todo el cuerpo una pasta compuesta así:

Oxido de cinc.....	20 gramos.
Polvo de talco.....	10 —
Polvo de almidón.....	15 —
Lanolina.....	} a a
Vaselina.....	

M.

Todas las ropas del enfermo deben cambiarse.

En los dos días siguientes, por las mañanas, se hará otra aplicación de petróleo y de la pasta. El último día se dará un baño de ducha muy cuidadoso.

El tratamiento puede reducirse a dos días. Excepcionalmente se han observado reincidencias.

Este tratamiento es de fácil aplicación y rápido y totalmente indoloro.

**LA NUEZ MOSCADA EN EL TRATAMIENTO DE LA DISENTERIA AMIBIANA.**—El doctor J. Leidy observa que algunos enfermos de disenteria amibiana no pueden soportar la emetina, o no se curan con ella. En estos casos, o cuando hay muchos quistes resistentes a la emetina, Leidy

ha empleado el polvo de nuez moscada, aconsejado por Avicenna y Penrose en los casos de fluxiones intestinales con ulceración. La mejoría es generalmente rápida aun en los casos en que la forma enquistada de *entamoeba histolytica* coexiste con otros parásitos protozoarios como el *tricomonas intestinalis*.

Debe preferirse el polvo al aceite de nuez moscada, porque éste produce fenómenos de intoxicación que pueden ser graves. Los signos de intoxicación son: vértigo, estupor, diplopía, dolores abdominales y colapso; el estupor dura de cuatro a seis horas y desaparece poco a poco.

La dosis del polvo es de un gramo a 1.50' antes de la comida, tres veces al día durante la primera semana; dos veces diarias en la segunda semana, y una vez por día en la tercera semana. Es bueno asociarle un polvo digestivo. Es posible que estemos en posesión de otro parasitocida específico de la *entamoeba histolytica*—(*Medical Record*).