

¿EL ERITEMA NUDOSO ES DE NATURALEZA TUBERCULOSA?

(Por el doctor J. B.)

El eritema nudoso no designa al decir de Tremolieres, sino la manifestación cutánea de una enfermedad general provocada por diversas infecciones. Los signos de esta enfermedad preceden y acompañan el eritema nudoso.

El eritema nudoso es enfermedad sobre todo frecuente en los individuos menores de 30 años y especialmente más común en el sexo femenino y reviste en ocasiones para algunas familias o colectividades la forma epidémica.

Todos sabemos que sus manifestaciones prodrómicas no se diferencian de las de una cualquiera infección: malestar, curbatura, cefalalgia, náuseas, inapetencia, estado saburral de las vías digestivas, fiebre, (38 a 40°), angina algunas veces y artralgias. El período de estado está constituido por estos mismos síntomas y a ellos viene a sumarse después de algunos días, la aparición del elemento eruptivo constituido por máculas a las cuales siguen rápidamente verdaderas pápulas rojizas que se anchan, se hacen salientes y forman en ocasiones verdaderas nudosidades. Estas pápulas, que son el elemento característico, son de consistencia dura, de un espesor que va desde el de una alverja hasta en ocasiones el de un huevo de gallina; pueden hallarse aisladas o fusionadas formando entonces verdaderas placas induradas de color rojo vivo al principio, de aspecto muy congestionado, la coloración pasando sucesivamente por el violáceo, el tinte verdoso y el amarillo. No son dolorosas espontáneamente, pero sí mucho a la presión del dedo o de la mano.

La erupción es muy neta en los miembros superiores e inferiores y se le observa solamente del lado de la extensión. En la cara tronco y manos es excepcional y entonces es tardía y bajo

ESTAFILASA del D^r DOYEN

Solución concentrada, inalterable, de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino,

Tratamiento específico contra las Infecciones Estafilocócicas :
ACNÉ, FORUNCULOSIS, ANTRAX, etc.

MICOLISINA del D^r DOYEN

Solución coloidal fagógena polivalente.

Provoca la fagocitosis, evita y cura la mayor parte de las **ENFERMEDADES INFECCIOSAS**

2 FORMAS: MICOLISINA BEBIBLE y MICOLISINA INYECTABLE.

Vino de Bugeaud

Tónico-Nutritivo, con Quina y Cacao.

Actúa por la Teobromina y por los Alcaloides de la Quina en la **NEURASTENIA, la ANEMIA y las CONVALECENCIAS**

Tratamiento específico completo de las *Afecciones Venosas*

Venosina

Comprimidos compuestos de Hipófitis y Tiroides en proporción prudencial, de Hamamells. Castaña de India y Citrato de Sosa.

PARIS, P. LEBEAULT & C^{ia}, 5, Rue Bourg-l'Abbé.
POR MENOR: PRINCIPALES FARMACIAS.

CURACION

RAPIDA Y RADICAL

SANTAL MIDY

DE LOS FLUJOS

resistentes e persistentes

En todas las Farmacias.

APIOLINA CHAPOTEAUT



Regulariza el flujo mensual,
corta los retrasos y
supresiones asi como
los dolores y cólicos
que suelen coincidir con las
epocas.

En todas Farmacias

SALUD DE LAS SENORAS

METODO CITOFILÁCTICO DEL PROF. DELBET

DELBIASE

**COMPRESIMIDOS DE SALES HALÓGENAS DE
MAGNESIO**

POTENTE ESTIMULANTE BIOLÓGICO

AUMENTA LA RESISTENCIA CONTRA LA FATIGA
FACILITA LA ACTIVIDAD CEREBRAL
REGULARIZA LAS FUNCIONES INTESTINALES Y HEPÁTICAS
DETIENE LOS DESÓRDENES URINARIOS DEBIDOS A LA HIPERTROFIA DE LA

PROSTATA

HACE DESAPARECER: ACNÉS, PRURITOS, ECZEMAS, VERRUGAS. ASI COMO
LAS AFECCIONES PRECANCEROSAS

Su uso regular constituye la cura preventiva del

CÁNCER

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE, 8, rue Vivienne, Paris-France
Y TODAS FARMACIAS

EL

HIERRO GIRARD

cura

los calambres de estomago,
el empobrecimiento
de la sangre,

la palidez de color;

fortifica los

temperamentos débiles;

excita el apatito;

regulariza

la menstruacion;

combate

la esterilidad.

PARIS, 8, rue Vivienne
y en todas las Farmacias



CÁPSULAS

DE

**MORRHUOL
CHAPOTEAUT**

EL MORRHUOL suprime
el gusto repugnante del
aceite de hígado de bacalao,
es mucho mas eficaz y con-
tiene todos sus principios.

EL MORRHUOL es popular
para curar los resfriados,
la bronquitis y los catarros.

En todas las Farmacias.

la forma de pápulas más discretas. Según algunos autores, puede también aparecer en la conjuntiva vulvar y en la córnea. Es excepcional en la mucosa bucal. La enfermedad tiene una duración de 10 a 15 días en los que la fiebre se mantiene alta y sus variaciones son en extremo caprichosas.

El diagnóstico diferencial del eritema nudoso es fácil de establecer. Sabemos que los traumatismos, las gomas sifilíticas o tuberculosas, los lepromas en ciertos casos, el eritema polimorfo y el producido por el yoduro, pueden asemejarse aunque muy remotamente al eritema nudoso.

Pero el clínico menos avisado puede fácilmente evitar el error si tiene presente en su espíritu las características de aquellas manifestaciones y las de la enfermedad de que me ocupo.

Más importante sí es tener presente que existen eritemas nudosos secundarios y que estos son los que se manifiestan en el curso de afecciones ya diagnosticadas: difteria, fiebre tifoidea, neumococia, blenorragia, septicemias, sífilis en su período secundario y en la tuberculosis, con la cual tiene relaciones muy importantes. En ocasiones coexiste con élla.

Etiología y patogenia.—Es este el punto capital del estudio que presento a la consideración de la Academia. Todos nosotros hemos tomado el eritema nudoso como clásica manifestación de reumatismo y aún muchos lo denominan "reumatismo nudoso". Pero he aquí que hoy el campo de su etiología y de su patogenia se ensancha con nuevas teorías y adquisiciones que tienden a considerar el eritema nudoso primitivo como manifestación tuberculosa. Ya he dicho enantes que el eritema puede también aparecer en el curso de una tuberculosis de cualquier órgano y por mi parte recuerdo haberlo visto en un niño que hacía una meningitis de la base y de naturaleza tuberculosa. Es la escuela médica argentina la que sostiene esta etiología. En efecto el doctor Raúl Cibils Aguirre en abril de 1930 hace una comunicación en tal sentido a las sociedades de Pediatría de Montevideo y Buenos Aires. Sus afirmaciones se basan sobre una serie de 72 observaciones clínicas seguidas en diferentes casos y épocas desde el año de 1911. Si los exámenes bacteriológicos de nódulos de eritema extirpados a varios enfermos, han dado resultado negativo, en cambio las inoculaciones a curies por vía subcutánea han sido seguidas de un resultado francamente positivo, lo cual lleva al

autor indo-hispánico a la conclusión de la etiología tuberculosa del eritema nudoso.

Sin compartir totalmente la tesis absoluta del colega argentino que ha quedado resumida en las líneas anteriores, debo declarar que evidentemente en algunos enfermos el eritema nudoso puede aparecer en el curso de una tuberculosis y aún llego a pensar que en muchos casos, el bacilo de Koch pueda producir esta sola manifestación cutánea. Pero si se tienen en cuenta la evolución clínica del eritema nudoso tal como se ha descrito y la observación de los enfermos que lo han sufrido años después de pasado éste, es menester aceptar que el eritema nudoso es una entidad morbosa bien individualizada y que me atrevo a clasificar en el grupo de fiebres eruptivas. Lo confirman en mis observaciones, el carácter epidémico de ellas pues he tenido la oportunidad de observar varios casos en miembros de una misma familia y aun en una observación, ser atacados casi simultáneamente los cinco niños que la componían.

En ninguna de estas veces he podido sospechar la evolución de una tuberculosis en quienes padecieron el eritema, ni en las personas que los rodeaban ni el tiempo transcurrido, ya de varios meses, ha dejado ver la evolución silenciosa o no de una tuberculosis.

Fuera de esta circunstancia de varios y simultáneos casos de eritema en una misma familia, he podido ver en Bogotá con otros colegas, pequeñas y esporádicas epidemias de la dicha enfermedad lo cual viene en ayuda de mi tesis de que ella puede ser aproximada al grupo de las fiebres eruptivas.

La evolución de la enfermedad se ha hecho siempre sin complicación alguna y dentro del cuadro clásico que nos describen los tratados. Sólo es de anotarse la intensidad de la fiebre y de la erupción que he observado son mayores en los niños que pasan de los 10 años de edad.

La terapéutica del eritema nudoso es sintomática y toda ella se reduce a calmar los dolores, sea por el salicilato sea por medio de fricciones locales. Es entendido que la dieta y el purgante se imponen desde el principio y que la fiebre en ocasiones muy elevada, cede muy bien a pequeñas dosis de criogenina.